

장건강, 이젠 낙산균 프로바이오틱스

의약외품

미야리산U_(정)

[제품명] 미야리산유정

[유효성분] 이 약 200mg 중- 1정 / 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균 50mg, 우르소데옥시콜산(동물유래성분) :

(기원동물 : 소, 사용부위 : 간증) 10mg

[첨가제] • 첨가제(동물유래성분): 유당(기원동물: 소, 사용부위: 우유) • 기타 첨가제: 결정셀룰로오스, 스테아린산마그네슘, 옥수수전분

[성상] 연한 회백색의 원형 정제

[효능효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체(체함)), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 정장, 변비, 묽은 변, 복부(배부분)팽만감, 장내이상발효

[용법용량] 아래의 1회 용량을 1일 3회, 식후 복용

연령(나이)	복용량(1회량)
15세 이상	2정
11세 이상 15세 미만	4/3정
8세 이상 11세 미만	1정

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

[포장단위] 180정/병

[제조번호],[사용기한](연.월.일까지) 밀면표시

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여한다.

3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

4. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영유아에게 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[첨부문서 작성일자] 2018년 11월 20일

[제조자] Miyarisan Pharmaceutical Co., Ltd. SAKAKI PLANT 102-15, Nakanojo, Sakaki-machi, Hanishina-gun, Nagano,
389-0682, Japan

[수입자] 신신제약(주), 경기도 안산시 단원구 범지기로141번길 90, 소비자상담실 : 031)707-3460, www.sinsin.com

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다. 사용기한이 지난 의약외품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 본 제품의 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 의약품 전자민원창구(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 정보'란을 참조 하시기 바랍니다.